

VRÉČICE
MEDICINSKI PROIZVOD CE 0426 - KORISTAN KOD ZATVORA

1. Identifikacija, sastav i namjena medicinskog proizvoda

Nutripharm® Laksol je medicinski proizvod laksativnog učinka, koji putem osmotskog mehanizma regulira rad crijeva na prirodan način. Ne apsorbira se, ne fermentira u crijevima, ne iritira sluznicu te se eliminira stolicom. Nutripharm® Laksol je posebno pogodan u slučajevima kronične konstipacije te kod povremeno nepravilnog rada crijeva. Zahvaljujući svojem afinitetu za vodu, Nutripharm® Laksol omekšava stolicu te olakšava pražnjenje crijeva bez grčeva, abdominalne boli ili hitnih stanja. Učinkovitost proizvoda se ne smanjuje tijekom dugotrajne upotrebe.

1.1 Sastojci

Jedna vrećica sadrži 10 g makrogol 3350
Pomoćne tvari: silicijev dioksid, aroma, saharin natrij

2. Pakiranje

Prašak za oralnu otopinu.
Kutija sadrži 10 vrećica za pojedinačnu upotrebu.

3. Doziranje i uputa za upotrebu

Odrasli i djeca starija od 12 godina: 1 vrećica (10 g) 1-3 puta na dan. U slučaju produljene upotrebe doza se može smanjiti na 1-2 vrećice na dan. Otopiti sadržaj vrećice u 125 ml (otprilike 1 čaša negazirane vode).

Djeca od 7 do 11 godina: 1 vrećica (10 g) 1-2 puta na dan.
Djeca od 2 do 6 godina (i težine veće od 10 kg): 1 vrećica (10 g) jedanput na dan.

4. Kontraindikacije

Ne uzimati Nutripharm® Laksol sa:
- intestinalne stenoze
- intestinalne perforacije
- upalnih bolesti crijeva (na primjer Crohnova bolest, ulcerozni kolitis)

Ne uzimati kod crijevne opstrukcije

Nema iskustva s korištenjem Nutripharm® Laksola tijekom trudnoće i dojenja stoga koristiti samo ako je neophodno i uz nadzor liječnika.

U pacijenata s bubrežnim oštećenjem nije potrebno prilagoditi dozu. Vrijeme korištenja Nutripharm® Laksola ne bi trebalo biti dulje od 2 tjedna. U slučaju potrebe liječenje se može ponoviti. Produljeno korištenje može biti neophodno kod tvrdokorne i/ili kronične konstipacije. Takva konstipacija može biti uzrokovana korištenjem lijekova, analgetika (opioidi) i kod liječenja Parkinsonove bolesti (antikolinergici), te u slučaju bolesti poput multiple skleroze ili Parkinsonove bolesti koje izazivaju tvrdokorni zatvor.

5. Nuspojave

U dozama potrebnim za terapijski učinak, nuspojave nisu zabilježene. Ponekad se mogu pojaviti gastrointestinalne poteškoće; zrak u crijevima, abdominalna bol, mučnina i blagi proljev (pogotovo u početku). Rijetko, mogu se javiti reakcije preosjetljivosti (osip i urtikarija). U slučaju nuspojava, uključujući i onih koje nisu navedene u ovoj

uputi, obavijestite liječnika ili ljekarnika. Kod perzistiranja simptoma nuspojave konzultirajte se s liječnikom. Ako ste zaboravili popiti jednu dozu, ne uzimajte dvostruku, nego uzmite sljedeću planiranu.

6. Interakcije s lijekovima

Do danas nema poznatih interakcija s lijekovima. Preporučuje se uzimati Nutripharm® Laksol najmanje dva sata nakon oralnog unosa lijeka, bilo kojeg drugog proizvoda (homeopatski lijekovi) ili dodatka prehrani jer osmotski efekt makrogola i ubrzan tranzit kroz crijeva mogu negativno utjecati na njihovu učinkovitost. Posavjetujte se s liječnikom prije uzimanja Nutripharm® Laksola u slučaju korištenja drugih lijekova.

7. Skladištenje

Čuvati Nutripharm® Laksol na suhom mjestu, daleko od izvora topline i izvora svjetlosti: otvorite vrećicu samo onda kada je planirate koristiti. Nemojte koristiti u slučaju da je vrećica oštećena. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati na temperaturi do 25°C.

8. Upozorenja i mjere opreza

Oralnu suspenziju treba pripremiti neposredno prije uzimanja proizvoda.

Ne koristiti u mlađih od 2 godine.

Trudnice i dojilje trebaju koristiti Nutripharm® Laksol samo nakon konzultiranja s liječnikom.

Ne prelaziti preporučene količine, više doze mogu uzrokovati neočekivane nuspojave.

Ne koristiti proizvod dulje od 30 dana u kontinuitetu. Ako su simptomi i dalje prisutni obratite se liječniku.

Ne uzimati u slučaju nepodnošenja proizvoda.

Ne uzimati u slučaju poznate preosjetljivosti na polietilen glikol ili druge sastojke.

Svaka vrećica je za jednokratnu upotrebu i preporučuje se otvoriti samo neposredno prije upotrebe.

9. Rok valjanosti

Ne koristiti nakon isteka datuma označenog na pakovanju.

Rok valjanosti se odnosi na proizvod u neoštećenom spremniku u navedenim uvjetima čuvanja.

10. Odlaganje

Kod isteka roka valjanosti proizvod se mora odlagati u skladu s pravilima odlaganja medicinskog otpada.

Ne odlagati spremnik ili njegovo pakovanje u okoliš.

Datum revizije: Ožujak 2018.



SIIT srl
Via Ariosto 50/60
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
ITALIA

Distributor:
Milsing d.o.o.
Velika cesta 99,
10020 Zagreb
HRVATSKA



0426