nutripharm®

Laksol Baby®

Makrogol

Simptomatsko liječenje zatvora
Djeluje unutar 24-72 sata

Oralna otopina spremna za uzimanje

SASTAV

Pročišćena voda, makrogol, limunska kiselina, kalijev sorbat, natrijev benzoat, sukraloza.

Bez glutena | Bez laktoze

PAKIRANJE

Nutripharm® Laksol Baby® dostupan je u sljedećem pakiranju:

Bočica od 250 ml s odmjernom čašicom

Odmjerna čašica je medicinski proizvod CE0373 proizvođača Bormioli Pharma SpA, Corso Magenta 84, 20123 Milano (MI), Italija.

MEHANIZAM DJELOVANJA

Makrogol je inertni polimer visoke molekularne mase, topiv u vodi. Ima sposobnost vezanja vode s kojom se uzima, zadržavajući je u stolici. Pospješuje rehidriranje i omekšavanje stolice te olakšava pražnjenje crijeva. Potiče peristaltiku ubrzavajući prolazak sadržaja kroz crijeva. Ne apsorbira se ni metabolizira u probavnom sustavu. Ukoliko se uzima s preporučenom količinom tekućine ne uzrokuje neravnotežu vode i elektrolita.

NAMJENA

Simptomatsko liječenje zatvora. Pospješuje peristaltiku i pomaže redovito pražnjenje crijeva, čime se sprječava zatvor i stvaranje fekaloma.

UPOZORENJA

Za primjenu u djece preporučuje se savjetovanje s liječnikom. Primjena u djece mora biti pod izravnim nadzorom odrasle osobe.

Trudnice i dojilje trebaju se posavjetovati s liječnikom prije uzimanja proizvoda.

Ne koristiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju.

Ne koristiti ako je pakiranje otvoreno ili oštećeno.

Proizvod može skratiti vrijeme potrebno za prolazak sadržaja kroz crijeva i time smanjiti apsorpciju oralno unesenih lijekova. Stoga se preporučuje savjetovanje s liječnikom u slučaju istovremene primjene oralnih lijekova, koji bi se, u svakom slučaju, trebali uzimati najmanje 2 sata nakon uzimanja ovog proizvoda.

Proizvod može imati potencijalni interakcijski učinak s prehrambenim zgušnjivačima na bazi škroba. Sastojak makrogol poništava učinak zgušnjavanja škroba i pretvara u tekuće pripravke one koji bi inače ostali gusti, kako bi se omogućilo njihovo gutanje osobama s problemima pri gutanju.

U slučaju neželjenih učinaka, prekinite liječenje i obratite se liječniku.

KONTRAINDIKACIJE

Ne uzimati **Nutripharm® Laksol Baby®** kod:

- poznate preosjetljivosti na jedan ili više sastojaka
- paralitičkog ileusa
- intestinalne perforacije, opstrukcije ili stenoze crijeva
- teške upalne bolesti crijeva (npr. ulcerozni kolitis, Crohnova bolest, toksični megakolon)

Primjena laksativa kontraindicirana je u slučaju akutne abdominalne boli, boli u trbuhu nepoznatog uzroka, mučnine i povraćanja, rektalnog krvarenja nepoznatog uzroka te teške dehidracije.

UVJETI ČUVANJA

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece. Čuvati na suhom i hladnom mjestu, podalje od izvora topline i svjetlosti. Nakon uporabe pažljivo zatvoriti bočicu. Nakon otvaranja proizvod upotrijebiti u roku od 3 mjeseca. Datum isteka roka valjanosti odnosi se na pravilno skladišten proizvod u neoštećenom pakiranju.

NAČIN PRIMJENE I DOZIRANJE

Kako biste odmjerili oralnu otopinu koristite odmjernu čašicu koja je dio pakiranja: napunite je prema dolje navedenom doziranju, koristeći oznake na površini odmjerne čašice.

Odrasli i djeca starija od 12 godina

- 20-80 ml dnevno

Doza se može povećati ili smanjiti ovisno o individualnom odgovoru na liječenje kako bi se pospješilo redovito pražnjenje meke stolice. Maksimalna dnevna doza obično ne prelazi 80 ml.

Oralna otopina uzima se u izvornom obliku, bez razrjeđivanja. Odmah nakon uzimanja proizvoda potrebno je popiti otprilike 125 ml vode za svakih 20 ml otopine.

Ako se uzima minimalna doza (20 ml dnevno), preporučuje se proizvod uzeti ujutro. Za više doze, podijelite unos na ujutro i navečer.

Ako ne primijetite poboljšanje nakon 7 dana liječenja, obratite se liječniku.

Djeca od 6 mjeseci do 12 godina

- 6-10 kg: 10 ml dnevno
- 10-15 kg: 10-20 ml dnevno
- 16-20 kg: 20-30 ml dnevno
- 21-43 kg: 30-40 ml dnevno

Doza se može povećati ili smanjiti ovisno o individualnom odgovoru na liječenje kako bi se pospješilo redovito pražnjenje meke stolice. Maksimalna dnevna doza obično ne prelazi 40 ml.

Oralna otopina uzima se u izvornom obliku, bez razrjeđivanja. Odmah nakon uzimanja proizvoda potrebno je popiti otprilike 60 ml vode za svakih 10 ml otopine.

Ako se uzima minimalna doza (10 ml dnevno), preporučuje se proizvod uzeti ujutro. Za više doze, podijelite unos na ujutro i navečer.

Ako ne primijetite poboljšanje nakon 7 dana liječenja, obratite se liječniku.

NUSPOJAVE

Mogu se pojaviti određene probavne smetnje (bol u trbuhu, nadutost, vjetrovi, mučnina i fekalna inkontinencija). Proljev je posljedica uzimanja previsoke doze **Nutripharm® Laksol Baby®** oralne otopine, a može se izbjeći smanjenjem doze.

Slučajevi preosjetljivosti (uključujući kožne i alergijske reakcije), kao i teške reakcije preosjetljivosti, rijetko su prijavljeni nakon primjene proizvoda koji sadrže makrogol. U slučaju pojave preosjetljivosti prestanite uzimati proizvod i obratite se svom liječniku.

Datum posljednje revizije: Svibanj 2026.

Biofarma, Via Castelliere 2,
Mereto di Tomba (UD), Italija

Distributer: Milsing d.o.o., Velika cesta 99, 10020 Zagreb, Hrvatska

(IFU1_01/25r0_07/25)

Medicinski proizvod CE 0373